

RECOMENDACIONES ANTE LA INYECCIÓN DE ÁCIDO HIALURÓNICO

- Aunque su médico le interrogue sobre ésto, comuníquelo si padece o ha padecido:

1. Infecciones (cutáneas, orales, respiratorias, gastrointestinales, urinarias, articulares... de cualquier otra localización o sistémicas, incluido VHS -si tiene antecedentes del mismo, puede precisar profilaxis del mismo previo a la inyección).
2. Patologías inflamatorias (cutáneas, articulares, gastrointestinales... o de cualquier otro tipo).
3. Patología cutánea de cualquier tipo (infecciosas, inflamatorias, alteraciones de la pigmentación)
4. Alteraciones del sistema inmune (hipersensibilidad o alergia, déficits inmunitarios, enfermedades autoinmunes).
5. Colagenosis.
6. Disfunción tiroidea (aumento de riesgo del edema palpebral no relacionado con el relleno).
7. Tratamiento inmunosupresor (aumento del riesgo de infecciones).
8. Trastornos metabólicos, intolerancias alimenticias, cirugías de la obesidad.
9. Estado catabólico y/o caquético (peor resultado).
10. Trastornos de la coagulación, toma de anticoagulantes.
11. Rellenos y tratamientos médico-estéticos previos.
12. Si tiene programados procedimientos dentales las dos semanas anteriores o posteriores al tratamiento con ácido hialurónico.

Si se le va a practicar una inyección perioral, enjuáguese previamente la cavidad oral con clorhexidina.

NO debe realizar tratamientos orales o periorales los 15 días anteriores y/o posteriores a un procedimiento odontológico.

Posterior al tratamiento:

- Los hematomas y edemas pueden ser relativamente habituales y suelen remitir espontáneamente a la semana.
- En caso de inflamación, puede aplicar frío local y masaje. Evite los AINES.

Tras el procedimiento, puede realizar una vida normal, con las siguientes precauciones:

- Evite durante las 24h siguientes el ejercicio extenuante y el calor intenso directo (sauna...), así como spas y piscinas.
- En el caso concreto del tratamiento médico labial con ácido hialurónico, además de lo anterior (también durante 24h), debe
 - a. Evitar los cosméticos (pintalabios) y utilizar uno nuevo.
 - b. El calor intenso en los labios (alimentos muy calientes, fumar...).
 - c. Aplicar dos veces al día un producto específico reparador e hidratante (*cicaplast*, *coralip*...).

